



# FLORFENIC ZAN 8

ANTIBIÓTICO



Registro: MAGA MX1149-07-01-16298

## PREMEZCLA MEDICADA

### Fórmula

Cada 1,000 g contienen:

Florfenicol.....80g

Excipiente, c.b.p. 1,000 g.

### Descripción

Está formulado en base a *Florfenicol* al 8%, antibiótico sintético derivado del ácido dicloro-acético; el *Florfenicol* posee amplia difusión tisular, es seguro, potente y de alta eficacia contra bacterias Gram negativas, Gram positivas y otros agentes patógenos, posee bajo índice de resistencia por inactivación bacteriana y sin riesgo de causar anemia aplásica. El *florfenicol*, posee un mecanismo de acción que actúa sobre la subunidad 50S de los ribosomas 70S, bloqueando la *peptil transferasa*, inhibiendo así la síntesis proteica bacteriana. Es considerado como uno de los antibióticos más seguros en la medicina veterinaria.

### Indicaciones

indicada para la prevención y tratamiento de las enfermedades en aves de engorda, gallinas de postura y reproductoras; causadas por: *Salmonella spp*, *Escherichia coli*, *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Haemophilus parasuis*, *Streptococcus suis*, *Mycoplasma spp (ERC)*; y *Actinobacillus pleuropneumoniae*. En cerdos para el control y tratamiento de los cuadros clínicos presentados en el Complejo Respiratorio Porcino, complicado por *Mycoplasma spp* y por patógenos como en *Pleuromonía*, *Ileítis*, *Artritis* y *Erisipelosis* entre otras, susceptibles al *Florfenicol*; en las cerdas reproductoras lactantes y en los cerdos de engorda durante las diferentes etapas de la producción como por destete y bajada al piso. *penicilinasas* y *cefalosporinasas*.

### Tiempos de Retiro

- Cerdos: Suspender el uso 5 días antes del sacrificio.
- Aves: Suspender el uso 8 días antes del sacrificio.
- No se administre en aves en producción de huevo que se destine al consumo humano.

### Dosis y vía de administración

**Especies:** Aves (Pollo de Engorda, Gallinas Reproductoras y Postura) y Porcinos.

**Administración:** Oral, mezclado en el alimento.

#### Preventiva y Curativa:

**Aves:** Gallinas reproductoras: Administrar de 0.5 a 1 kg de **FLORFENIC 8** por tonelada de alimento terminado, durante la 6ª y 16ª semana de edad y durante 1 semana al mes hasta llegar al pico de la producción. Pollos de engorda: Administrar de 0.5 a 1 kg de **FLORFENIC 8** por tonelada de alimento terminado o para peletizado, durante la 2ª y 5ª semana de edad.

**Cerdos:** Cerdas reproductoras durante toda la lactancia: Administrar 500g de **FLORFENIC 8** por tonelada de alimento terminado. (40ppm de florfenicol) Cerdos de engorda desde 0 a 35 kg de peso vivo: Administrar de 500 g a 1 kg de **FLORFENIC 8** por tonelada de alimento terminado. (40ppm de florfenicol / 80ppm de florfenicol)

### Advertencias

- Consérvese en lugares frescos y secos, no expuestos a la luz solar directa.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

**Presentación:** Saco de 25 Kilos.

**Consulte al Médico Veterinario.**

Distribuido por:  **PROVUMEX**<sup>®</sup>